

**Errata zum aktuellsten Nachdruck
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1**

Anmerkung:

Zeilenangaben: Es sind nur beschriebene Zeilen mit Ausnahme der Kopfzeile gezählt.

S.	Zeile / Absatz	Korrektur
IV	Linke Spalte unten	3. korrigierter Nachdruck 2011
VII	Drittletzte Zeile	Tumoren (ausgenommen Appendix) 89
XII	Z. 13	2) Periodische
XIV	Z. 1	Abkürzungen (Erläuterungen siehe angegebene Seite)
XIV	Z. 2	autoptisch (S. 16)
XIV	Z. 3	klinisch (S. 7)
XIV	Z. 4	(Diagnosesicherheit) (S. 18)
XIV	Z. 5	Grading (S. 15)
XIV	Z. 7	2000 (S. 9)
XIV	Z. 8	Tumorzellen (S. 13)
XIV	Z. 9	Lymphgefäßinvasion (S. 17)
XIV	Z. 10	Tumoren (S. 16)
XIV	Z. 11	Fernmetastasen (S. 10)
XIV	Z. 12	Lymphknotenmetastasen (S. 10)
XIV	Z. 13	pathologisch (S. 17)
XIV	Z. 14	Invasion (S. 17)
XIV	Z. 15	Rezidivtumor (S. 16)
XIV	Z. 16	Behandlung (S. 19)
XIV	Z. 17	Sentinel-Lymphknoten (S. 13)
XIV	Z. 18	Stadiengruppierung (S. 20)
XIV	Z. 19	Primärtumors (S. 10)
XIV	Z. 20	Veneninvasion (S. 17)
XIV	Z. 21	Therapie (S. 16)
14	Absatz einfügen nach Z. 15	Anmerkung pM0 und pMX sind keine anwendbaren Kategorien.
20	(vor)letzte Zeile	Diese.....unverändert. ((Satz streichen)) ...Lymphknoten über Supraklavikulargrube, ... ((statt
36	Z. 16	„oberhalb“))

**Errata zum aktuellsten Nachdruck
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1**

42	Z. 17	T2 Ausbreitung auf Stimmlippen, diese normal oder...
42	Z. 25	N1 ... ≤ 3 cm
47	Z. 21-23	T4a ... Schädelgrube (minimal), Processus pterygoideus, Keilbeinhöhle, ... („Nasen-“ und „Fossa infratemporalis“ streichen))
48	Z. 2	C00-06, C09.1, C09.08, C09.9, C10, 11, 14, 30.0, 32)
48	Z. 19	T4a... Knochen,
49	Z. 2	Lymphknotenmetastasen
49	Absatz einfügen nach Z. 18	G: Histopathologisches Grading Ein Grading ist nicht anwendbar.
61	Z. 15	und distale extrahepatische
65	Z. 15	((links neben M1 bitte Balken einfügen))
67	Z. 2	Plattenepithelkarzinome*
67	unter letzter Zeile: Fußnote einfügen	*oder gemischte Histologie mit plattenepithelialer Komponente oder nicht bestimmte Histologie
76	Z. 10	GIST des Magens*
89	Z. 10	Merkelzellkarzinome der Haut haben
92	Z. 15	wenigstens 40 Felder
93	Z. 4	Submukosa ≤ 1 cm
97	Z. 5	N1a Metastase(n) in 1
98	viertletzte Zeile	T3, T4a („T4b“ streichen))
104	Z. 1	Leber – Hepatozelluläre Karzinome
107	Z. 1	Leber – Intrahepatische Gallengänge
111	Z. 20	((bei N1 Balken streichen))
111	Z. 20-22	in Lymphknoten des...V. portae ((Wörter streichen))
112	Z. 9	Stadiengruppierung (Gallenblase und Ductus cysticus) T1 Schleimhaut und Muskulatur („Gallenblasenwand“ streichen))
112	Z. 18	
112	Z. 23	T4 mehr extrahepatische Organe
112	Z. 24-25	N1 Regionär ((restliche Wörter „ , ...portae“ streichen))
115	Z. 15	Stadium IVA ((statt IIIA))

**Errata zum aktuellsten Nachdruck
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1**

115	(vor-)letzte Zeile	N1 Regionäre Lymphknoten ((restliche Wörter „ , ...portae“ streichen))
129	Z. 18	(siehe Literatur, S. 135).
130	9. Zeile von unten	Ausdehnung oder Tumor mit direkter
130	vorletzte Zeile	oder ((italics))
141	letzte Zeile	„hochgradig“.
141	letzte Zeile	((Absatz von S. 144 darunter einfügen))
144	Z. 13	((Überschrift entfällt))
144	Tabelle	((Tabelle hier streichen und stattdessen auf nach „G:“- Absatz von S. 141 einfügen))
144	vorletzte Zeile	Anmerkungen
144	letzte Zeile	...klassifiziert. Wenn der Grad nicht bestimmt werden kann, soll für die Stadiengruppierung geringgradig verwendet werden.
146	Z. 2	(ICD-0 C38.1-3, C47, 48, 49)
155	Z. 9	N3 Metastase(n) in Lymphknoten,...
156	7. Zeile von unten	> 2 mm Dicke
162	Z. 16-18	M1c.....(LDH) ((links Balken einfügen))
162	5., 4., (vor)letzte Zeile von unten	((Einzug nach „pT1a“, „pT1b“, „pT2a“, „pT2b“, siehe Z. 13-14))
162	5. Zeile von unten	pT1a < 1 Mitose/mm ² („Clark-Level II oder III“ streichen))
162	4. Zeile von unten	pT1b ≥ 1 Mitose/mm ² („Clark-Level IV oder V“ streichen))
164	Z. 3	((streichen)) Stadium I ... M0
164	Z. 12, 17, 18	Jedes pT
165	Z. 2	pT1a ≤ 1mm, <1 Mitose/mm ² ((Level II oder III“ streichen))
165	Z. 3	pT1b ≤ 1mm, ≥ 1 Mitose/mm ² ((Level IV oder V“ streichen))
165	Z. 18-19	makro-skopisch
165	unter letzter Zeile	M1 Fernmetastasen M1a Haut, Subkutis, Lymphknoten jenseits der

**Errata zum aktuellsten Nachdruck
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1**

		regionären
		M1b Lungen
		M1c Andere Lokalisation als Lunge, Fernmetastasen mit erhöhten LDH-Serumwerten
168	viertletzte Zeile	M1 Fernmetastasen
170	drittletzte Zeile	...axilläre Lymphknoten, Level I klassifiziert
171	Z. 13 - 16	Tis Tumor ((Balken links einfügen))
177	Z. 2	• „ypN“
178	Z. 6	Stadium IB T0, T1'
178	viertletzte Zeile	1 cm ((Leerzeile zwischen „1“ und „cm“ einfügen))
181	vorletzte Zeile	Pecorelli, S. Revised...
181	letzte Zeile	...Obstet 105, 5; 2009:103-104 ...inguinofemorale (Leisten-)Lymphknoten. ((statt „groin“))
184	vorletzte Zeile	„groin“))
188	Z. 7 von unten	...basieren auf klinischem Staging, die TNM-Stadien...
193	Z. 17	T1.....unbeachtet bleiben)
197	Z. 6	...Ausbreitung ≤ 7 mm
197	Z. 7	...Ausbreitung ≤ 7 mm
199	Z. 6 von unten	N1/N2 ((statt N1))
199	viertletzte Zeile	N1 ((in 1. Spalte links neben „IIIC1“ einfügen))
202	viertletzte Zeile	N1 Lymphknotenmetastasen Becken IIIC1
202	drittletzte Zeile	N2 Lymphknotenmetastasen paraaortal IIIC2 +/- Becken
205	Z. 13 - 14	T1b IB Tumor infiltriert weniger als die Hälfte des Myometriums
205	Z. 15 - 16	T1c IC Tumor infiltriert die Hälfte des Myometriums oder mehr
209	(vor)letzte Zeile	...Ovarien, mit mikroskopisch oder makroskopisch nachgewiesenen...
210	Z. 12	...Fernmetastasen (jedoch nicht Peritonealmetastasen)
214	Z. 8 von unten	... mit mikroskopisch oder makroskopisch nachge-

**Errata zum aktuellsten Nachdruck
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1**

		wiesenen...
215	Z. 1	IIIC Makroskopische Peritonealmetastasen
221	Z. 3	...7 oder mehr...
228	Z. 12 - 13	N1 palpabel/mobil („vergrößert“ streichen))
228	Z. 4 -1 von unten	((Spalteneintrag von „Fixierte...Lymphadenopathie“ auf eine Zeilenhöhe wie „N3“ setzen, nach oben bündig ausrichten))
231	Z. 11	...(leichte Anaplasie) (Gleason 2-6)
232	Z. 5 von unten	Anmerkung ((statt „Anwendung“))
240	Z. 8 von unten	N1 Regionäre Lymphknotenmetastasen
240	Z. 7 von unten	((Zeile streichen > „N2...Lymphknoten“))
241	Z. 12	((Zeile streichen > „Jedes...M0))
241	vorletzte Zeile	N1 Regionär ((statt „Solitär“))
241	letzte Zeile	((streichen))
249	Z. 3	...in situ (flat tumor)
249	Z. 5-6 von unten	...Prostata, Samenblasen, Uterus...
253	viertletzte Zeile	T4 Nachbarorgane (z.B. Blase)
263	vorletzte Zeile	((unter Zeile „T4...“ vier Zeilen einfügen:)) T4a Orbitaweichteile ohne Knocheninfiltration T4b Knochen T4c Angrenzende Nasennebenhöhlen T4d Gehirn
268	Z. 2	pTis ((in 3. Spalte von links einfügen))
268	Z. 2	In situ ((in 4. Spalte von links einfügen, in Zeile von „Tis“))
268	Z. 11	Nicht bulbäre Konjunktiva („ , Hornhaut“ streichen))
268	Z. 14 - 19	((„ , Substantia propria“ in 4. Spalte streichen))
270	Z. 11 - 13	T2 ... Glaukom ((Balken links streichen))
270	Z. 17	...mit extraokulärer Ausbreitung
271	Z. 9, Tabelle	((in letzter Zeile mit Eintrag „≤3.0“ Linie anders setzen: d.h. senkrechter Strich zw. „2“ und „2“ = zw. 6. und 7. Spalte entfällt, dafür waagrechten Strich zw. „2“ und „3“ =

**Errata zum aktuellsten Nachdruck
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1**

		zw. Zeile 6 und 7 der Tabelle))
274	Z. 10 - 11	T3 Tumor konfluierend, Ausbreitung auf Ziliarkörper und/oder Chorioidea oder Sklera
274	Z. 16	Malignes Melanom des Ziliarkörpers und der Chorioidea ((statt „Iris“))
276	letzte Zeile	...oder der Fovea entfernt ((statt „Papille“))
280	Z. 3	≤ 2/3 des ...
280	Z. 8	≤ 3mm, mindestens...
280	Z. 11	Fovea ((statt „ Papille“))
280	Z. 17	> 3 mm, weniger...
281	Z. 1	...ausgedehnter Nachweis...
281	Z. 14 von unten	Mehr als eine Komplikation ((statt Komplikationen))
283	Z. 2	(ICD-O C69.6, 69.8)
287	Z. 6	...Weichgewebe eingeschlossen Nervus opticus oder Bulbus
292	Z. 15	...den auf S. 291 angegebenen... ((statt „S. 289“))
294	Z. 10 von unten	...Diffuser oder multifokaler Befall...